



## Poruke upozorenja prilikom propisivanja sistemskih formulacija lijeka diklofenak (ATC: M01AB05) u informacionom sistemu primarne zdravstvene zaštite (ISPZZ)

Nakon unosa i ovjere stavke posjete kroz formu *Kontakt*, u zavisnosti od unijete dijagnoze (MKB) i već ranije postavljenih dijagnoza (radnih i konačnih) iz kartona pacijenta, na formama *Recepti* i *Nalozi* prilikom propisivanja lijeka diklofenak javiće se odgovarajuće poruke upozorenja koje su kreirane u cilju racionalnog propisivanja diklofenaka i njegove bezbjedne primjene, naročito u vezi sa većim kardiovaskularnim rizicima pri neracionalnom propisivanju ovog lijeka.

**U slučaju da je izabrana dijagnoza sa liste dijagnoza koje su kontraindikovane za primjenu diklofenaka, na formi *Recepti*, nakon izbora lijeka, klikom na obavezno polje *Upotreba*, pojaviće se poruka:**



Analogno, **prilikom kreiranja naloga za ampulirani diklofenak**, nakon izbora lijeka, a prije unosa količine, javiće se poruka identična poruci koja se pojavljuje prilikom propisivanja oralnih i rektalnih formulacija diklofenaka:



U slučaju da je izabrana dijagnoza sa liste dijagnoza za koje postoji pojačan oprez u slučaju propisivanja diklofenaka, na formi *Recepti*, nakon izbora lijeka, klikom na obavezno polje *Upotreba*, zavisno od formulacije diklofenaka javiće se poruke upozorenje:

#### Kod propisivanja oralnih formulacija diklofenaka:

The screenshot shows the 'RECEPTI' application window with a table of prescriptions. A dialog box titled 'Posebna upozorenja i mjere opreza!' is displayed over the table. The dialog contains the following text:

**Posebna upozorenja i mjere opreza!**  
 Pacijenti sa kongestivnom srčanom insuficijencijom (NYHA klasa 1) i pacijenti koji imaju značajne faktore rizika za nastanak kardiovaskularnih događaja (npr. hipertenzija, hiperlipidemija, dijabetes melitus, pušenje) terapiju diklofenakom **treba da započnu tek nakon pažljive procjene**.  
 Preporučena maksimalna dnevna doza je 150 mg. **Kod blažih slučajeva, kao i kod dugotrajne terapije, 75 do 100 mg dnevno je obično dovoljno.**  
 Neželjena dejstva se mogu svesti na najmanju moguću mjeru korišćenjem najniže efektivne doze, u najkraćem vremenskom periodu, neophodnom za kontrolu simptoma.

#### Kod propisivanja rektalnih formulacija diklofenaka:

The screenshot shows the 'RECEPTI' application window with a table of prescriptions. A dialog box titled 'Posebna upozorenja i mjere opreza!' is displayed over the table. The dialog contains the following text:

**Posebna upozorenja i mjere opreza!**  
 Pacijenti sa kongestivnom srčanom insuficijencijom (NYHA klasa 1) i pacijenti koji imaju značajne faktore rizika za nastanak kardiovaskularnih događaja (npr. hipertenzija, hiperlipidemija, dijabetes melitus, pušenje) terapiju diklofenakom **treba da započnu tek nakon pažljive procjene**.  
 Preporučena maksimalna dnevna doza je 150 mg.  
 Neželjena dejstva se mogu svesti na najmanju moguću mjeru korišćenjem najniže efektivne doze, u najkraćem vremenskom periodu, neophodnom za kontrolu simptoma.

Analogno, **prilikom propisivanja ampulirane formulacije diklofenaka po nalogu**, nakon izbora lijeka, a prije unosa količine javiće se poruka:

The screenshot shows the 'RECEPTI' application window with a form for 'Nalog za ampulirane lijekove'. A dialog box titled 'Posebna upozorenja i mjere opreza!' is displayed over the form. The dialog contains the following text:

**Posebna upozorenja i mjere opreza!**  
 Pacijenti sa kongestivnom srčanom insuficijencijom (NYHA klasa 1) i pacijenti koji imaju značajne faktore rizika za nastanak kardiovaskularnih događaja (npr. hipertenzija, hiperlipidemija, dijabetes melitus, pušenje) terapiju diklofenakom **treba da započnu tek nakon pažljive procjene**.  
 Preporučena maksimalna dnevna doza je 150 mg.  
**Ne treba primjenjivati duže od dva dana;** ukoliko je neophodno, terapija se može nastaviti diklofenak tabletama ili supozitorijama.  
 Neželjena dejstva se mogu svesti na najmanju moguću mjeru korišćenjem najniže efektivne doze u najkraćem vremenskom periodu neophodnom za kontrolu simptoma.

Ukoliko pacijent u svom kartonu ima dijagnozu/e za koje je kontraindikovano propisati diklofenak kao i dijagnozu/e za koje postoji pojačan oprez, prilikom propisivanja diklofenaka, javiće se poruka upozorenja vezana za dijagnozu/e za koje je kontraindikovano propisati diklofenak.

